

BIJSLUITER

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

**Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray
Oplossing voor cutaan gebruik**

ENKEL VOOR UITWENDIG GEBRUIK

Belangrijke informatie over de bestanddelen van Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g Huidspray

Dit product bevat benzalkoniumchloride 0,20% w/w als werkzaam bestanddeel en 20,8 mg propyleenglycol per 1 ml, dat huidirritatie kan veroorzaken.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 5 dagen niet minder of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Inhoud vandeze bijsluiter:

1. Wat is Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Med Benzalkoniumchloride 2mg/g huidspray en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray wordt gebruikt om verse kleine wonden te reinigen en om gewone bacteriën die geassocieerd zijn met infectie van lichte wonden, te verwijderen. Het product is niet bedoeld om de wondheling te verbeteren of om gebruikt te worden om de wondheling te verbeteren. Het mag niet worden gebruikt op grote of ernstige wonden en het is enkel bestemd voor kortdurend, plaatselijk kortetermijngebruik. Het mag maar eenmaal per 24 uur worden gebruikt.

Het is gebruiksklaar en moet niet worden verdund.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- bij zuigelingen jonger dan 12 maanden
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- Niet voor langdurig gebruik of voor gebruik meer dan éénmaal per 24 uur.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

- rond de ogen, de oren of de geslachtsorganen of in de mond. In geval van accidenteel oogcontact, het oog spoelen met een grote hoeveelheid koud water
- Niet inademen/enkel voor uitwendig gebruik
- op grote wonden van meer dan 5% van de lichaamsoppervlakte (5% komt ongeveer overeen met kleine wonden op beide knieën en ellebogen).

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Het gebruik van Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray wordt niet aanbevolen als u een ander soortgelijk product gebruikt omdat er geen studies zijn over de effecten bij gebruik met andere geneesmiddelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit medicijn gebruikt. Gebruik tijdens de zwangerschap of de borstvoeding zal naar verwachting niet gepaard gaan met schadelijke effecten. Om echter te voorkomen dat een kind dat borstvoeding krijgt, het product zou inslikken, wordt gebruik op de borsten tijdens de borstvoeding niet aanbevolen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray heeft geen invloed op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen.

Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray bevat Benzalkoniumchloride

Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray bevat 2 mg benzalkoniumchloride in elke huidspray.

Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray bevat Benzylalcohol, Benzylbenzoeaat, Benzylsalicylaat, Citral, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Hexylcinnamaldehyde, D-Limoneen en Linalool.

Benzylalcohol, Benzylbenzoeaat, Benzylsalicylaat, Citral, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Hexylcinnamaldehyde, D-Limoneen en Linalool kunnen allergische reacties veroorzaken.

Benzalkoniumchloride kan de huid irriteren. Breng dit middel niet aan op de borsten als u borstvoeding geeft, want de baby kan het met de melk binnenkrijgen.

Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray bevat propyleenglycol

Dit middel bevat 20.8 mg propyleenglycol per 1 ml

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volg bij het gebruik van Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray nauwgezet de onderstaande gebruiksaanwijzing, tenzij uw arts u iets anders heeft geadviseerd. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Enkel voor uitwendig gebruik

Bij het eerste gebruik of als het product al lang niet meer werd gebruikt, kan het nodig zijn de spray eerst op een doekje of iets dergelijks te spuiten, om ervoor te zorgen dat een volledige spray wordt gespoten op de wond.

Voor volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar: spuit een volledige dosis (1 tot 2 sprays) eenmaal op elke wond en laat vijf minuten inwerken. Gebruik zo nodig een schoon doekje of gaasje om het teveel aan vocht af te vegen.

Voor kinderen van 1 tot 6 jaar: vraag voor gebruik advies aan een apotheker of een andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg als u zich ergens zorgen over maakt. Spuit eenmaal (1 spray) op elke wond (**mag op maximaal 4 wonden per keer worden aangebracht**) en laat vijf minuten inwerken. Gebruik zo nodig een schoon doekje of gaasje om het teveel aan vocht af te vegen.

Spuit van een afstand van 4 tot 15 cm. Niet inademen.

Zeep kan de spray inactiveren; dus niet gebruiken om ook de wond te wassen.

De spray mag opnieuw worden aangebracht als de wond weer is opengegaan, maar is niet bestemd voor langdurig gebruik en mag maar eenmaal in 24 uur worden gebruikt gedurende hoogstens 3-5 dagen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, of als u zich zorgen maakt over uw symptomen, vraag dan uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Bijwerkingen zijn zeer zelden opgetreden (bij minder dan 1 gebruiker op de 10.000) bij lokale reiniging van kleine huidwonden: hieronder vallen jeuk, huiduitslag, huidirritatie, brandend gevoel, zwelling en verkleuring

van de huid. Er kan een reactie optreden op de plaats waar het product werd gebruikt, zoals schilfering van de huid. Wanneer dergelijke reactie optreedt, staak het gebruik van het product en raadpleeg uw arts of apotheker. Als u aan eczeem lijdt, kan het gebruik van dit product het eczeem verergeren. Haaruitval werd gerapporteerd.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op het etiket na {EXP}. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Na eerste gebruik van de pompspray is het 6 maanden houdbaar.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afgevoerd worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

- Dewerkzame stof in dit medicijn is benzalkoniumchloride 0,20% w/w
- De andere stof(fen) in dit medicijn zijn propyleenglycol, natriumdiwaterstoffsosfaat dihydraat, dinatriumwaterstoffsosfaat dodecahydraat, zacht pijnboomaroma, dinatriumedetaat dihydraat en gezuiverd water

Hoe ziet Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray eruit en wat zit er in de verpakking

Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray is een heldere, kleurloze oplossing met een lichte pijnboomgeur. Het wordt gebruiksklaar geleverd in pompspray van 10 ml en 100 ml.

Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer

Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray is ingeschreven onder RVG 102385

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Reckitt Benckiser Healthcare B.V.

Radarweg 60

1043 NT Amsterdam

Fabrikant:

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Nederland

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2026.

Dit medicijn is geregistreerd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte onder de volgende namen:

Bulgarije	Dettol Med Wound Spray 0,20 % w/w Cutaneous Spray, In local language (script)
Tsjechië (CZ)	Dettolmed Antiseptický sprej 0,20%w/w Benzalkonii chloridum
Estland	Dettol Med
Hongarije	Dettol Med külsőleges oldatos spray
Ierland (IE)	Benzalkonoium chloride Reckitt Benckiser Spray
Letland	Dettol Med 0,20 % uz ādas izsmidzināms aerosols, šķīdums
Portugal (PT)	Detolpro 2 mg/g Cutaneous spray, solution
Slovakije	DettolMed 2 mg/g dermalno pršilo, raztopina”.
Roemenië	Dettol Med 0,2% spray cutanat, soluție