

## **Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**

Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g, concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik

### **ALLEEN VOOR UITWENDIG GEBRUIK**

#### **Belangrijke informatie over de bestanddelen van Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g**

Dit product bevat chloroxylenol 4,8% mg/g als werkzaam bestanddeel; dat kan de huid prikkelen.

Het moet voor gebruik verdund worden met water.

#### **Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Dit medicijn kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **Inhoud van deze bijsluiter:**

1. Wat is Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. WAT IS DETTOL MED CHLOORXYLENOL 48 MG/G EN WAARVOOR WORDT DIT MEDICIJN GEBRUIKT?**

Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g geeft na verdunnen met water een melkachtige oplossing. De verdunde oplossing wordt gebruikt voor antiseptische reiniging van snijwonden, bijt wonden, schaafwonden en insectenbeten en steken.

Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g is een geconcentreerde oplossing en dient te worden verdund vóór gebruik.

**Gebruik Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g niet onverdund.**

#### **2. WANNEER MAG U DIT MEDICIJN NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?**

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 12 maanden.

##### **Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzigt mee zijn?**

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- als u eczeem heeft

Niet gebruiken rond de ogen, oren, neus of mond. Niet gebruiken op grote delen van het lichaam of op een gevoelige huid.

Bij inslikken de mond spoelen en veel water of melk drinken. Bij onopzettelijk contact met de ogen, oren, neus of mond, goed spoelen met koud water. In beide gevallen wordt aanbevolen om een arts te raadplegen.

Indien de oplossing onverdund wordt gebruikt, moet u de huid goed wassen en een arts raadplegen wanneer huidreacties optreden.

### **Gebruikt u nog andere medicijnen?**

Gebruikt u naast Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Er zijn geen specifieke studies uitgevoerd. Het is daarom niet aanbevolen Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g gelijktijdig met andere uitwendige medicijnen te gebruiken.

### **Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**

Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap onder medisch toezicht. Het wordt niet aanbevolen dit medicijn aan te brengen op de huid van de borsten tijdens borstvoeding.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g heeft geen invloed op rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

### **Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g bevat Benzylalcohol en een allergenenbevattende geurstof.**

Dit medicijn bevat geurstof met d-Limoneen en sporen van Benzylalcohol. D-Limoneen en Benzylalcohol kunnen allergische reacties veroorzaken. Benzylalcohol kan lichte plaatselijke irritatie veroorzaken.

## **3. HOE GEBRUIKT U DIT MEDICIJN?**

Dit medicijn is bestemd voor uitwendig gebruik.

Wonden, beten, schrammen en insectenbeten: Verdun 50 ml Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g met water tot 1 liter (1:20) en was de zone met deze verdunde oplossing. Afdekken met droog gaas of met watten opgevuld verband.

Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g kan worden gebruikt bij volwassenen en kinderen vanaf 12 maanden.

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Zeer zelden (minder dan 1 op 10.000 personen): Huidreacties kunnen optreden zoals irritatie, huiduitslag, afsterving van de huid, kloven op plaats van aanbrengen, ontsteking, huidontkleuring, jeuk, huidafschilfering en een brandend gevoel. Haarverlies werd ook gerapporteerd.

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald): Allergische reactie, huidsensibilisatie, brandwonden op de toedieningsplaats.

### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit medicijn.

## 5 HOE BEWAART U DIT MEDICIJN?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op het etiket na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Dit medicijn vereist geen speciale bewaarcondities. De oplossing dient direct na verdunning te worden gebruikt.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

## 6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

### Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

- De werkzame stof in dit medicijn is chloorxylenol 48 mg/g
- De andere stoffen in dit medicijn zijn: dennenolie, isopropylalcohol, ricinusolie, karamel (E150(c)) en zuiver water.

### Hoe ziet Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g er uit en wat zit er in een verpakking

Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g is een helder, amberkleurige concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik. De verdunde oplossing heeft een melkachtig witte kleur. Het wordt verpakt in flacons van 125, 250, 500, 750, 1000 en 1250 ml. Niet alle genoemde verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g is ingeschreven onder RVG 34838

### Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder:

Reckitt Benckiser Healthcare B.V., Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp, Nederland

Fabrikant:

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Nederland

### Dit medicijn is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| België    | Dettolmedical Chloroxylenol 4.8% |
| Nederland | Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g |
| Luxemburg | Dettolmedical Chloroxylenol 4.8% |

**Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2022.**